

吉林省中药材标准、中药饮片炮制规范勘误汇总表

标准名称	刊载	页码	原文内容	勘误为
榛子花	《吉林省中药材标准》 (第一册) 2019年版	338	【性状】本品呈圆柱形，长1~3.5cm，直径4~7mm，基部具短梗。表面黄棕色至红棕色，柔毛不明显，苞鳞呈覆瓦状排列。质脆，易折断。断面柔毛较多，可见放射状排列的淡黄色或棕色的花药。 ——	【性状】本品单个雄花序呈短圆柱形，常数个聚在一起，雄花序长1~3.5cm，直径0.4~0.7cm，有的基部可见短梗。表面黄棕色或红棕色，柔毛不明显，苞鳞呈覆瓦状排列，先端呈刺状，呈现螺旋状纹理。质脆，易折断。断面可见放射状排列的由数个纵隔形成的室，内含淡黄色或棕色的花粉。 ——
			【鉴别】(1)——花粉粒众多，极面观呈钝三角形，赤道面观呈广椭圆形，外壁光滑，具三个萌发孔，直径为16~26μm。花药表皮细胞扁平多角形、壁呈不均匀增厚，具非腺毛，长30~150μm。苞鳞表皮细胞棕黄色，呈不规则多角形，苞鳞非腺毛长50~260μm，直径达5μm。花粉囊细胞内边缘呈波状弯曲。	【鉴别】(1)——花粉粒众多，极面观呈钝三角形，具三个萌发孔，直径16~26μm，赤道面观呈广椭圆形，外壁光滑。非腺毛长30~260μm。花粉囊细胞扁平多角形，壁呈不均匀增厚。苞鳞表皮细胞棕黄色，呈不规则多角形。

		【鉴别】(2)——再取槲皮素对照品，加乙酸乙酯制成每 1ml 含 0.2mg 的溶液，作为对照品溶液。—— ——吸取上述三种溶液各 5μl，—— ——在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。——	【鉴别】(2)——删去“再取槲皮素对照品，加乙酸乙酯制成每 1ml 含 0.2mg 的溶液，作为对照品溶液。”—— ——吸取上述两种溶液各 3~5μl，—— ——在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。——
	341	起草说明【性状】本品呈圆柱形，长 1~3.5cm，直径 4~7mm，其基部具短梗。表面黄棕色至红棕色，柔毛不明显，苞鳞呈覆瓦状排列。质脆，易折断。断面柔毛较多，可见放射状排列的淡黄色或棕色的花药。——	起草说明【性状】本品单个雄花序呈短圆柱形，常数个聚在一起，雄花序长 1~3.5cm，直径 0.4~0.7cm，有的基部可见短梗。表面黄棕色或红棕色，柔毛不明显，苞鳞呈覆瓦状排列，先端呈刺状，呈现螺旋状纹理。质脆，易折断。断面可见放射状排列的由数个纵隔形成的室，内含淡黄色或棕色的花粉。——
	342	起草说明【鉴别】(1)——花粉粒众多，极面观呈钝三角形，具三个萌发孔，直径为 16~26μm。花药表皮细胞扁平多角形，壁呈不均匀增厚，具非腺毛，长 30~150μm。苞鳞表皮细胞棕黄色，呈不规则多角形，	起草说明【鉴别】(1)——花粉粒众多，极面观呈钝三角形，具三个萌发孔，直径 16~26μm，赤道面观呈广椭圆形，外壁光滑。非腺毛长 30~260μm。花粉囊细胞扁平多角形，壁呈不均匀增厚。苞鳞表皮细胞棕黄色，呈不规则多角形。

			苞鳞非腺色长 50 ~ 260μm，直径达 5μm。花粉囊细胞内边缘呈波状弯曲。	
	342	起草说明	图4 橘子花粉末 1.表皮毛 2.花粉囊内壁细胞 3.花粉表皮细胞 4.苞鳞表皮细胞 5.胞鳞非腺毛 6.花粉粒 图4 橘子花粉末 1.花粉粒 2.非腺毛 3.花粉囊细胞(a 连珠状增厚 b 网状增厚) 4.苞鳞表皮细胞	起草说明图 4 榛子花粉末 (删去 1.表皮毛 3.花药表皮细胞的图) 勘误为:
羊角	114	《吉林省中药材标准》	[2]——中国药用植物志[M].——	[2]——中国药用动物志[M].——

	(第二册) 2019年版			
酒益母 草	《吉林省中 药饮片炮制 规范》(第一 册)2020年 版	178	来源——地上部分的炮加工制品。	来源——地上部分的加工炮制品。
酒锁阳	《吉林省中 药饮片炮制 规范》(第一 册)2020年 版	248	品种名称:酒锁阳起草人:阚鹏甲	品种名称:酒锁阳起草人:阚朋甲
零陵香	《吉林省中 药饮片炮制 规范》(第一	222 ~ 223	【鉴别】(3)取本品粉末1g,加甲醇20ml,超声处理1小时,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇2ml使溶解,作为供试品溶液。另取零陵香对照药材1g,	【鉴别】(3)取本品粉末1g,加无水乙醇50ml,再加盐酸3ml,加热回流1小时,滤过,滤液浓缩至约3ml,加水15ml使溶解,用三氯甲烷振荡提取2次,每次20ml,合并三氯甲烷液,蒸干,残渣

	册) 2020 年 版		同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2020 年版四部通则 0502) 试验, 吸取上述两种溶液各 5 ~ 10 μ l, 分别点于同一硅胶 G 薄层板上, 以石油醚 (60 ~ 90 $^{\circ}$ C) - 乙酸乙酯-甲醇 (8.5 : 1.5 : 0.5) 为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 置紫外光灯 (365nm) 下检视。供试品色谱中, 在与对照药材色谱相应的位置上, 至少显四个红色荧光斑点和一个蓝色荧光斑点。	加乙醇 2ml 使溶解, 作为供试品溶液。另取零陵香对照药材 1g, 同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法 (《中国药典》2020 年版四部通则 0502) 试验, 吸取上述两种溶液各 3 μ l, 分别点于硅胶 G 薄层板上, 以石油醚 (60 ~ 90 $^{\circ}$ C) - 三氯甲烷-甲醇 (5 : 10 : 0.5) 为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 喷以 10% 硫酸乙醇溶液, 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中, 在与对照药材色谱相应的位置上, 显相同颜色的斑点。
榛子花	《吉林省中药饮片炮制规范》(第一册) 2020 年版	224 ~ 225	【鉴别】(2) ——再取槲皮素对照品, 加乙酸乙酯制成每 1ml 含 0.2mg 的溶液, 作为对照品溶液。 —— ——吸取上述三种溶液各 3 ~ 5 μ l, —— ——在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上, 显相同颜色的荧光斑点。——	【鉴别】(2) ——删去“再取槲皮素对照品, 加乙酸乙酯制成每 1ml 含 0.2mg 的溶液, 作为对照品溶液。” —— ——吸取上述两种溶液各 3 ~ 5 μ l, —— ——在与对照药材色谱相应的位置上, 显相同颜色的荧光斑点。——

猪胆汁	《吉林省中药材标准》 (第一册) 2019 年版	253	【鉴别】——残渣加乙醇 10ml 使溶解，作为供试品溶液。——	【鉴别】——残渣加乙醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。——
	起草说明	256	【鉴别】——残渣加乙醇 10ml 使溶解，作为供试品溶液。——	【鉴别】——残渣加乙醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。——
牛髓	《吉林省中药材标准》 (第一册) 2019 年版	65	起草说明概述“——为中药成方制剂血宝胶囊、血宝片、益血生胶囊等的原料药材。——”	起草说明概述“——为中药成方制剂血宝胶囊、血宝片的原料药材。——”